

Government of West Bengal  
Directorate of Health Services, PH & CD Branch  
Swasthya Bhawan (Wing-B, 1<sup>st</sup> Floor)  
Block-GN, No.-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700 091

Memo. No. HPH/10P-03/2018 /29/


Dated- 24/9/2021

To

All CMOHS

ARI/ILI cases are being reported in increased numbers from different parts of West Bengal since recent past. In order to control and manage such illness an Expert Committee has been formed and an SOP for case management along with a surveillance guideline & a daily report pro-forma has already been shared with you. Now, to strengthen the process of involving the ANM/ MPH(M)/ ASHA/ AWW/ HHW in the affected areas for early case identification, monitoring of home based management and subsequent referral (if necessary), a brief guideline is being sent herewith (see Annexure).

The guideline may be widely circulated among all Blocks and Municipalities.


  
Jt.DHS(PH & CD) 24/9/21  
Govt of W.B.

Memo. No. HPH/10P-03/2018/29/1(8)

Dated- 24/9/2021

Copy forwarded for information & necessary action please-

- 1.MD(NHM) Swasthya Bhawan, H & FW, Govt.of W.B.
- 2 D.H.S, Govt.of W.B, H & F.W.
- 3.AMD(II) NHM, Govt.of W.B, H & F.W.
- 4.S.F.W. Swasthya Bhawan
- 5.C.M.H.O-kolkata Municipal corporation.
- 6.D.A.D.H.S(Child Health), Swasthya Bhawan.
- 7.State Nodal Officer(NUHM), Swasthya Bhawan
- 8,Dy.CMOH-II---All District

  
Jt.DHS(PH & CD) 24/9/21  
Govt. of W.B.

## শিশুদের ARI/ILI সংক্রান্ত নির্দেশিকা : জনস্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য

### ARI/ILI রোগের সাধারণ উপসর্গগুলি হল : -

- ১) তিন বা তার অধিক দিন জ্বর।
  - ২) নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যাথা বা কশি।
  - ৩) সারা শরীরে ব্যথা।
  - ৪) কিছু কিছু ক্ষেত্রে বমি ও পাতলা পায়খানা।
  - ৫) দ্রুত শ্বাস নেওয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া।
- বিঃদ্র:- পরিবারের অন্য কোনও সদস্যেরও একই রকম উপসর্গ থাকতে পারে।

### গৃহ চিকিৎসা

- ১) বেশী পরিমাণে জল ও তরল খাবার খাওয়ানো হবে।
- ২) পাতলা পায়খানা হলে O.R.S. খাওয়ানো হবে।
- ৩) জ্বরের জন্য প্রয়োজনে প্যারাসিটামল দিতে হবে। ডোজ ১০-১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম প্রতিবার ; সর্বাধিক দিনে পাঁচবার এবং সর্বনিম্ন চারঘণ্টার ব্যবধানে খাওয়ানো হবে।
- ৪) ওষুধে জ্বর না কমলে স্বাভাবিক জল দিয়ে গা মোছাতে এবং মাথা ঝোঁকানো হবে।
- ৫) নাক বন্ধ হয়ে গেলে লবণ জলের ফোঁটা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৬) জ্বর, শ্বাস-এর হার, খাওয়ার পরিমাণ এবং প্রদাহ-এর পরিমাণ এর উপর নজরদারি রাখতে হবে।

### বিপদ লক্ষণগুলি হল -

- ১) তিন থেকে পাঁচ দিনের ক্রমাগত জ্বর অথবা ধূম জ্বর।
- ২) স্বাভাবিকের থেকে দ্রুত শ্বাস, অর্থাৎ -

<u>বয়স</u>	<u>শ্বাস-এর গতি</u>
০ - ২ মাস	শ্বাসের গতি মিনিটে ৬০ বারের বেশী
২ মাস - ১ বছর	শ্বাসের গতি মিনিটে ৫০ বারের বেশী
১ বছর - ৫ বছর	শ্বাসের গতি মিনিটে ৪০ বারের বেশী
৫ বছরের বেশী বয়স	শ্বাসের গতি মিনিটে ৩০ বারের বেশী

- ৩) শ্বাস নেওয়ার সাথে বুকের মাংসপেশী ডিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, নাকের পাটা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।
- ৪) শিশুর সারদিনের খাওয়ার পরিমাণ আর্জেকের কম হয়ে যাওয়া।
- ৫) দিনে পাচবারের কম প্রসার হওয়া।
- ৬) সাধারণ ডিম্বুনি/বেইশ ডাব। হঠাৎ খিটুনি হওয়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

কোনওরকম বিপদসঙ্কণ থাকলে অবিলম্বে শিশুকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিন।

বি: দ্র: - অপুষ্টি, ডায়াবেটিস, হার্ট/শ্বাস-প্রশ্বাস/কিডনির রোগ বা অন্য কোন গুরুতর অসুখে আক্রান্ত শিশুর যদি ARI/ILI- এর লক্ষণ দেখা দেয়, তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বাড়িতে রেখে দেবেন না।

#### কী করবেন :-

- ১) হাঁচি ও কাশির সময় নাক-মুখ যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে হবে। নাক ও মুখ কনুই দিয়ে আড়াল করুন।
- ২) ঘন ঘন সাবান ও জল দিয়ে হাত ধুতে হবে। হাত ধোওয়ার সুযোগ না থাকলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- ৩) উপসর্গ আছে এমন ব্যক্তিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে রাখুন।
- ৪) দুই বছরের নীচের শিশুর বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন। সে যেন কোনওভাবেই আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ না আসে।
- ৫) বেশী পরিমাণে জল ও তরল খাবার খাওয়তে হবে।

#### কী করবেন না :-

- ১) চোখে, নাকে, মুখে অথবা হাত লেবেন না।
- ২) যেখানে সেখানে কফ বা খুঁত ফেলবেন না।
- ৩) নিত্র থেকে ওয়ুখ খাবেন না।
- ৪) ডিড পরিবেশ বা স্থান যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।

৯ বছর হওয়া সন্তানের স্বাস্থ্য ও পরিচর কন্যায় শিশুর হাতে প্রকশিত  
কাকতায়, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১